



## 2.2 行列式的性质与计算

主要内容: 行列式的性质

行列式的计算

方阵乘积的行列式



# 行列式的性质

## 一. 行列式的性质

**性质1** 行列式按任一行展开，其值相等，即

$$\det A = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in},$$

其中  $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ ,  $M_{ij}$  为划去  $A$  的第  $i$  行第  $j$  列后所得的  $n-1$  阶行列式,  $A_{ij}$  称为  $a_{ij}$  的代数余子式。



$$\begin{aligned} \text{例1 } D &= \begin{vmatrix} 4 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 7 & 4 & 3 & 2 \end{vmatrix} = -2 \begin{vmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 3 \\ 7 & 4 & 3 \end{vmatrix} = -2 \times 4 \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} \\ &= -2 \times 4 \times (-15) \end{aligned}$$

例2 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} \mathbf{a}_{11} & \mathbf{a}_{12} & \cdots & \mathbf{a}_{1n} \\ & \mathbf{a}_{22} & \cdots & \mathbf{a}_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & 0 & & \mathbf{a}_{nn} \end{vmatrix}$$

解

$$D_n = \mathbf{a}_{nn} \begin{vmatrix} \mathbf{a}_{11} & \mathbf{a}_{12} & \cdots & \mathbf{a}_{1,n-1} \\ & \mathbf{a}_{22} & \cdots & \mathbf{a}_{2,n-1} \\ & & \ddots & \vdots \\ & 0 & & \mathbf{a}_{n-1,n-1} \end{vmatrix}$$

# 行列式的性质

$$= \mathbf{a}_{nn} \mathbf{a}_{n-1,n-1} \begin{vmatrix} \mathbf{a}_{11} & \mathbf{a}_{12} & \cdots & \mathbf{a}_{1,n-2} \\ \mathbf{a}_{22} & \cdots & \mathbf{a}_{2,n-2} \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & & \mathbf{a}_{n-2,n-2} \end{vmatrix} = \cdots = \mathbf{a}_{11} \mathbf{a}_{22} \cdots \mathbf{a}_{nn}$$

同理

$$\mathbf{D}_n = \begin{vmatrix} * & & \mathbf{a}_n \\ & \ddots & \\ \mathbf{a}_2 & & \\ \mathbf{a}_1 & 0 & \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \mathbf{a}_1 \mathbf{a}_2 \cdots \mathbf{a}_n$$



# 行列式的性质

**推论** 若行列式的某一行全为零，则行列式等于零。

**性质2**  $n$ 阶行列式某两行对应元全相等，则行列式为零。  
即当  $a_{ik} = a_{jk}$  ,  $i \neq j, k=1, \dots, n$  时,  $\det A = 0$ 。

**证** (归纳法) 结论对二阶行列式显然。

设结论对  $n-1$  阶行列式成立，对于  $n$  阶：按第  $k (\neq i, j)$  行展开

$$\det A = a_{k1}A_{k1} + a_{k2}A_{k2} + \cdots + a_{kn}A_{kn}, \quad (k \neq i, j)$$

由于  $M_{kl} (l=1, \dots, n)$  是  $n-1$  阶行列式，且其中都有两行元全相等，所以

$$A_{kl} = 0 \quad (k = 1, \dots, n), \quad \text{故 } \det A = 0.$$

# 行列式的性质

## 性质3

$$\begin{vmatrix}
 \mathbf{a}_{11} & \mathbf{a}_{12} & \cdots & \mathbf{a}_{1n} \\
 \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\
 \mathbf{b}_{i1} + \mathbf{c}_{i1} & \mathbf{b}_{i2} + \mathbf{c}_{i2} & \cdots & \mathbf{b}_{in} + \mathbf{c}_{in} \\
 \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\
 \mathbf{a}_{n1} & \mathbf{a}_{n2} & \cdots & \mathbf{a}_{nn}
 \end{vmatrix}
 =
 \begin{vmatrix}
 \mathbf{a}_{11} & \mathbf{a}_{12} & \cdots & \mathbf{a}_{1n} \\
 \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\
 \mathbf{b}_{i1} & \mathbf{b}_{i2} & \cdots & \mathbf{b}_{in} \\
 \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\
 \mathbf{a}_{n1} & \mathbf{a}_{n2} & \cdots & \mathbf{a}_{nn}
 \end{vmatrix}
 +
 \begin{vmatrix}
 \mathbf{a}_{11} & \mathbf{a}_{12} & \cdots & \mathbf{a}_{1n} \\
 \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\
 \mathbf{c}_{i1} & \mathbf{c}_{i2} & \cdots & \mathbf{c}_{in} \\
 \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\
 \mathbf{a}_{n1} & \mathbf{a}_{n2} & \cdots & \mathbf{a}_{nn}
 \end{vmatrix}$$



# 行列式的性质

按第*i*行展开

$$\begin{aligned} \text{证 左} &= (b_{i1} + c_{i1})A_{i1} + \cdots + (b_{in} + c_{in})A_{in} \\ &= (b_{i1}A_{i1} + \cdots + b_{in}A_{in}) + (c_{i1}A_{i1} + \cdots + c_{in}A_{in}) \end{aligned}$$

$$= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{i1} & b_{i2} & \cdots & b_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ c_{i1} & c_{i2} & \cdots & c_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

# 行列式的性质

例3

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 5 & 7 & 9 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 1+4 & 2+5 & 3+6 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 \end{vmatrix}$$

$$= 0 + 0 = 0$$

**观察：** 与矩阵加法的区别？



**性质4**（行列式的初等变换）若把行初等变换施于 $n$ 阶矩阵 $A$ 上：

(1) 将 $A$ 的某一行乘以数 $k$ 得到 $A_1$ ，则

$$\det A_1 = k(\det A);$$

(2) 将 $A$ 的某一行的 $k$  ( $\neq 0$ ) 倍加到另一行得到 $A_2$ ，则

$$\det A_2 = \det A;$$

(3) 交换 $A$ 的两行得到 $A_3$ ，则  $\det A_3 = -\det A$ .

**证** (1) 按乘以数  $k$  的那一行展开, 即得结论成立。

(2)

$$\det A_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{j1} + ka_{i1} & \cdots & a_{jn} + ka_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{j1} & \cdots & a_{jn} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ ka_{i1} & \cdots & ka_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$= \det A + k \cdot 0 = \det A$$

(3)

$$\det A_3 = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{j1} & \cdots & a_{jn} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \begin{matrix} \\ \\ j\text{行} \\ = \\ \\ i\text{行} \\ \\ \end{matrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{j1} & \cdots & a_{jn} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{j1} + a_{i1} & \cdots & a_{jn} + a_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$



$$= \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ -a_{i1} & \cdots & -a_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{j1} + a_{i1} & \cdots & a_{jn} + a_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ -a_{i1} & \cdots & -a_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{j1} & \cdots & a_{jn} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$= -\det A$$

**推论** 若行列式某两行对应元成比例，则行列式的值为零.

## 应用:

1. 设 $A$ 为 $n$ 阶矩阵，则  $\det(kA) = k^n (\det A)$ .
2. 初等矩阵的行列式:

$$\det(E_{ij}) = \det(E_{ij}I) = -\det I = -1$$

$$\det E_i(c) = c \neq 0;$$

$$\det E_{ij}(c) = 1.$$



## 初等矩阵与任一方阵A乘积的行列式:

$$\det(E_{ij}A) = -\det A = (\det E_{ij})(\det A),$$

$$\det(E_i(c)A) = c(\det A) = (\det E_i(c))(\det A),$$

$$\det(E_{ij}(c)A) = \det A = (\det E_{ij}(c))(\det A).$$

对任一初等矩阵 $E$ ,  $\det(EA) = (\det E)(\det A)$

设 $E_1, E_2, \dots, E_t$ 为初等矩阵, 则

$$\det(E_1E_2 \cdots E_tA) = (\det E_1) \cdots (\det E_t)(\det A)$$



# 行列式的性质

例4 求矩阵A的行列式 $|A|$ ， $2|A|$ 和 $|2A|$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

解：

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -2 & -3 \\ 0 & -1 & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{vmatrix} = 1$$

$$2|A| = \begin{vmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 2 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \dots = 2$$

$$|2A| = \begin{vmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 4 & 4 & 6 \\ 2 & 2 & 2 \end{vmatrix} = 2 \cdot 2 \cdot 2 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 8$$

**注意:**

$$2|A| \neq |2A|$$

一般,

$$\left| k A_{n \times n} \right| = k^n |A| \neq |k A|.$$



# 行列式的性质

**性质5** 设 $A$ 为 $n$ 阶矩阵, 则

$$\det(A^T) = \det A.$$

**证** 当 $A$ 不可逆时:

设  $A \xrightarrow{\text{初等行变换}} R$  (最后一行的元全为零)

即存在初等矩阵  $E_1, E_2, \dots, E_t$ ,

$$A = E_1 E_2 \cdots E_t R$$

$$\det R = 0 \Rightarrow \det A = (\det E_1) \cdots (\det E_t) (\det R) = 0.$$

又 $A$ 不可逆 $\Leftrightarrow A^T$ 不可逆 所以  $\det A^T = 0$

**当A可逆时：** 存在初等矩阵  $E_1, E_2, \dots, E_s$ ,

$$\text{有 } A = E_1 E_2 \cdots E_s$$

$$\begin{aligned} \det(A^T) &= \det(E_s^T \cdots E_2^T E_1^T) \\ &= (\det E_s^T) \cdots (\det E_2^T) (\det E_1^T) \\ &= (\det E_s) \cdots (\det E_2) (\det E_1) \\ &= (\det E_1 \det E_2 \cdots \det E_s) \\ &= \det A \end{aligned}$$

由性质5,  $\det A = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \cdots + a_{nj}A_{nj}$ ,  $j = 1, \dots, n$  20

例5. 奇数阶反对称阵的行列式必为零.

**证** 设 $A_{n \times n}$  ( $n$ 为奇数)满足:

$$A^T = -A,$$

$$\begin{aligned} \text{于是, } \det A &= \det A^T = \det(-A) \\ &= (-1)^n \det A = -\det A, \end{aligned}$$

## 例6 计算4阶行列式

$$D = \begin{vmatrix} a^2 + \frac{1}{a^2} & a & \frac{1}{a} & 1 \\ b^2 + \frac{1}{b^2} & b & \frac{1}{b} & 1 \\ c^2 + \frac{1}{c^2} & c & \frac{1}{c} & 1 \\ d^2 + \frac{1}{d^2} & d & \frac{1}{d} & 1 \end{vmatrix} \quad (\text{已知 } abcd = 1)$$

解:

$$D = \begin{vmatrix} a^2 & a & \frac{1}{a} & 1 \\ b^2 & b & \frac{1}{b} & 1 \\ c^2 & c & \frac{1}{c} & 1 \\ d^2 & d & \frac{1}{d} & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \frac{1}{a^2} & a & \frac{1}{a} & 1 \\ \frac{1}{b^2} & b & \frac{1}{b} & 1 \\ \frac{1}{c^2} & c & \frac{1}{c} & 1 \\ \frac{1}{d^2} & d & \frac{1}{d} & 1 \end{vmatrix}$$



$$= abcd \begin{vmatrix} a & 1 & \frac{1}{a^2} & \frac{1}{a} \\ b & 1 & \frac{1}{b^2} & \frac{1}{b} \\ c & 1 & \frac{1}{c^2} & \frac{1}{c} \\ d & 1 & \frac{1}{d^2} & \frac{1}{d} \end{vmatrix} + (-1)^3 \begin{vmatrix} a & 1 & \frac{1}{a^2} & \frac{1}{a} \\ b & 1 & \frac{1}{b^2} & \frac{1}{b} \\ c & 1 & \frac{1}{c^2} & \frac{1}{c} \\ d & 1 & \frac{1}{d^2} & \frac{1}{d} \end{vmatrix}$$

$= 0.$



# 行列式的性质

## 行列式性质小结：

一、按行展开： $D = a_{i_1}A_{i_1} + a_{i_2}A_{i_2} + \cdots + a_{i_n}A_{i_n}$

二、三类初等变换：

1. 换行反号， 2. 倍乘， 3. 倍加。

三、三种为零：1. 有一行全为零， 2. 有两行相同，  
3. 有两行成比例。

四、一种分解

五、 $D^T = D$ 。

例7. 设  $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 7 \\ 2 & 4 & -3 \\ -3 & 7 & 2 \end{pmatrix}$  , 求  $\det A$ .

解.

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & -3 & 7 \\ 0 & 10 & -17 \\ 0 & -2 & 23 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -3 & 7 \\ 0 & 10 & -17 \\ 0 & 0 & \frac{196}{10} \end{vmatrix} = 196$$



# 行列式的计算

例8. 计算  $D = \begin{vmatrix} 1 & 4 & -1 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \\ 4 & 2 & 3 & 11 \\ 3 & 0 & 9 & 2 \end{vmatrix}$

解.

i)  $-2*r_2+r_3$ ; ii)  $-4*r_2+r_1$

$$D = \begin{vmatrix} -7 & 0 & -17 & -8 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & -5 & 5 \\ 3 & 0 & 9 & 2 \end{vmatrix} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} -7 & -17 & -8 \\ 0 & -5 & 5 \\ 3 & 9 & 2 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} -7 & -25 & -8 \\ 0 & 0 & 5 \\ 3 & 11 & 2 \end{vmatrix} = -5 \cdot \begin{vmatrix} -7 & -25 \\ 3 & 11 \end{vmatrix} = 10$$

## 例9. 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} x & y & \cdots & y \\ y & x & \cdots & y \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ y & y & \cdots & x \end{vmatrix}$$

解.

$$D_n = \begin{vmatrix} x + (n-1)y & y & \cdots & y \\ x + (n-1)y & x & \cdots & y \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ x + (n-1)y & y & \cdots & x \end{vmatrix} = (x + (n-1)y) \begin{vmatrix} 1 & y & \cdots & y \\ 1 & x & \cdots & y \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & y & \cdots & x \end{vmatrix}$$

$$= (x + (n-1)y) \begin{vmatrix} 1 & y & \cdots & y \\ 0 & x-y & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & x-y \end{vmatrix}$$

$$= [x + (n-1)y](x-y)^n$$

## 例10. 证明范德蒙行列式 ( $n \geq 2$ )

$$V_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & x_3^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j),$$

证.

$$n = 2: \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ x_1 & x_2 \end{vmatrix} = x_2 - x_1, \text{ 结论成立。}$$



# 行列式的计算

设对于 $n-1$ 阶结论成立，对于 $n$ 阶：

Tip: 从最后一行开始，上一行乘以 $-x_1$ 分别加到下一行

$$\begin{aligned}
 V_n &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & x_2 - x_1 & x_3 - x_1 & \cdots & x_n - x_1 \\ 0 & x_2(x_2 - x_1) & x_3(x_3 - x_1) & \cdots & x_n(x_n - x_1) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & x_2^{n-2}(x_2 - x_1) & x_3^{n-2}(x_3 - x_1) & \cdots & x_n^{n-2}(x_n - x_1) \end{vmatrix} \\
 &= (x_2 - x_1)(x_3 - x_1) \cdots (x_n - x_1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ x_2^{n-2} & x_3^{n-2} & \cdots & x_n^{n-2} \end{vmatrix}
 \end{aligned}$$

$n-1$ 阶范德蒙行列式

$$V_n = (x_2 - x_1)(x_3 - x_1) \cdots (x_n - x_1) \prod_{2 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j) = \prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j)$$

## 例11

$$D = \begin{vmatrix} a & a^2 & a^3 & a^4 \\ b & b^2 & b^3 & b^4 \\ c & c^2 & c^3 & c^4 \\ d & d^2 & d^3 & d^4 \end{vmatrix} = abcd \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 & a^3 \\ 1 & b & b^2 & b^3 \\ 1 & c & c^2 & c^3 \\ 1 & d & d^2 & d^3 \end{vmatrix} = abcd \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 & d^3 \end{vmatrix}$$

$$= abcd (d-c)(d-b)(c-b)(d-a)(c-a)(b-a)$$



# 行列式的计算

例12. 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} 1+a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & 1+a_2 & \cdots & a_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix}$$

解. 加边法

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 0 & 1+a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 0 & a_1 & 1+a_2 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & a_1 & a_2 & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ -1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 + \sum_{i=1}^n a_i & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix} = 1 + \sum_{i=1}^n a_i$$

(再考虑例9?)



# 方阵乘积的行列式

- 解决:**
- 1.可逆矩阵与行列式;
  - 2.矩阵乘积的行列式.

**定理1.** 方阵 $A$ 可逆的充要条件为  $\det A \neq 0$ .

**证.**  $A \xrightarrow{\text{行初等变换}} R$  (简化行阶梯形)

即存在初等矩阵 $E_1, \dots, E_t$ 使得  $A = E_1 \cdots E_t R$

$\Leftarrow$ : 已知 $\det A \neq 0$ . 若 $A$ 不可逆,

则 $R$ 的最后一行的元全为零, 所以 $\det R = 0$ .



$$\det A = (\det E_1) \cdots (\det E_t)(\det R) = 0, \text{ 矛盾.}$$

$\Rightarrow$ : 若 $A$ 可逆, 则 $R=I$ ,

$$\det A = (\det E_1) \cdots (\det E_t)(\det I) \neq 0.$$



# 方阵乘积的行列式

**定理2.** 设 $A, B$ 为 $n$ 阶方阵, 则

$$\det(AB) = (\det A)(\det B).$$

**证.** 设 $A \xrightarrow{\text{行初等变换}} R$  (简化行阶梯形)

即存在初等矩阵 $E_1, \dots, E_t$ 使得  $A = E_1 \cdots E_t R$

$$\begin{aligned} \det(AB) &= \det(E_1 \cdots E_t RB) \\ &= (\det E_1) \cdots (\det E_t) (\det(RB)). \end{aligned}$$

若 $A$ 可逆, 则 $R=I$ ,



$$\begin{aligned}\det(AB) &= (\det E_1) \cdots (\det E_t) (\det(IB)) \\ &= (\det A)(\det B).\end{aligned}$$

若 $A$ 不可逆, 则 $R$ 的最后一行全为零,  $RB$ 的最后一行全为零.

$$\det(AB) = 0$$

$$(\det A)(\det B) = 0(\det B) = 0.$$



# 方阵乘积的行列式

**推论1** 设 $A_i$  ( $i=1, \dots, t$ )为 $n$ 阶矩阵, 则

$$\det(A_1 A_2 \cdots A_t) = (\det A_1) \cdots (\det A_t).$$

**推论2** 设 $A, B$ 为 $n$ 阶矩阵, 且 $AB=I$  (或 $BA=I$ ), 则 $B=A^{-1}$ .

**证**  $\det(AB) = (\det A)(\det B) = \det I = 1$ .

所以  $\det A \neq 0$ .  $A$ 可逆

$$A^{-1} AB = A^{-1} I = A^{-1}$$

$$B = A^{-1}$$



$$\text{应用: } \det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A}$$

Tip:  $A^{-1}A=I$



# 方阵乘积的行列式

**例13** 设  $AA^T = I$  且  $|A| = -1$ , 证明:  $|-I - A| = 0$ .

$$\begin{aligned} \text{证: } |-I - A| &= |-AA^T - A| \\ &= |A(-A^T - I)| \\ &= |A| |(-A - I)^T| \\ &= -|-A - I| \\ &= -|-I - A| \\ \therefore |-I - A| &= 0. \end{aligned}$$



## 例14 设

$$\Lambda = \begin{pmatrix} 0 & & & & \\ & 1 & & & \\ & & 2 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & n-1 \end{pmatrix}, \quad P^{-1}BP = \Lambda, \quad \text{求: } |I + B|.$$

解:  $B = P\Lambda P^{-1}$ ,

$$\begin{aligned} |I + B| &= |I + P\Lambda P^{-1}| = |PIP^{-1} + P\Lambda P^{-1}| \\ &= |P(I + \Lambda)P^{-1}| = |P||I + \Lambda||P^{-1}| \end{aligned}$$



$$= |P| |P^{-1}| |I + \Lambda| = |I + \Lambda|$$

$$= n!$$

## 思考题

设 $n$ 阶行列式  $D_n = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 2 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & n \end{vmatrix}$

求第一行各元素的代数余子式之和:

$$A_{11} + A_{12} + \cdots + A_{1n}.$$



# 方阵乘积的行列式

解 第一行各元素的代数余子式之和可以表示成

$$A_{11} + A_{12} + \cdots + A_{1n} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 2 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & n \end{vmatrix} = n! \left( 1 - \sum_{j=2}^n \frac{1}{j} \right).$$

Tip: 从第2列开始乘以-1/2, -1/3, ....分别加到第1列



行列式的性质

行列式的计算

方阵乘积的行列式